

# 자연 진통 후 분만한 만삭 산모에서 제대염 및 조직학적 용모양막염의 빈도와 위험인자

이승미, 이경아, 양혜진, 박찬욱, 박중신, 전종관, 신희철, 윤보현

서울대학교 의과대학 산부인과학교실

## Objectives (목적)

이 연구는 자연 진통 후 분만한 만삭 산모에서 제대염과 조직학적 용모양막염의 빈도 및 그 위험인자를 알아보기 위해 시행되었다.

## Methods (연구 방법)

자연 진통 후 분만한 만삭 단태 임신 산모에서 태반 조직 검사를 실시하여, 제대염과 조직학적 용모양막염의 빈도 및 임상적 특징과의 연관성을 분석하였다. 비모수적 방법이 통계 검정에 사용되었다.

## Results (결과)

1) 자연 진통 후 분만한 1270명의 산모 중, 제대염 및 조직학적 용모양막염의 빈도는 각각 6%, 23% 였다; 2) 로지스틱 회귀분석 결과 제대염의 발생은 긴 진통 시간과 연관이 있었고, 조직학적 용모양막염의 발생은 미분만부 및 긴 진통 시간과 연관이 있었다.

## Conclusions (결론)

제대염 및 조직학적 용모양막염은 진통 시간이 길수록 빈도가 증가하였다.